

**BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG
HIV/AIDS**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /AIDS-DP

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

V/v thực hiện công tác phòng,
chống dịch COVID-19 tại các cơ
sở điều trị nghiện các chất dạng
thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Hiện nay tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh/thành phố trên cả nước, có nguy cơ dịch bệnh tiềm ẩn trong cộng đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, xã hội, trong đó có tác động đến những người nghiện các chất dạng thuốc phiện đang điều trị thay thế bằng thuốc Methadone và Buprenorphine. Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở điều trị/cơ sở cấp phát thuốc (sau đây gọi tắt là cơ sở điều trị) cũng như đảm bảo an toàn cho cán bộ, nhân viên và bệnh nhân tại các cơ sở điều trị, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cụ thể như sau:

1. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc phòng ngừa và các biện pháp kiểm soát lây truyền tại các cơ sở điều trị đặc biệt là khu vực cấp phát thuốc theo quy định hiện hành của Bộ Y tế (thực hiện nghiêm túc Thông điệp 5K của Bộ Y tế tại các cơ sở điều trị).

2. Đối với nhân viên công tác tại các cơ sở điều trị:

- Tuân thủ thực hành phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa dựa theo đường lây truyền, áp dụng các biện pháp dự phòng giọt bắn, dự phòng tiếp xúc, dự phòng lây truyền qua đường không khí (đeo khẩu trang, sử dụng găng tay y tế và các phương tiện hỗ trợ khác nếu cần) khi thực hiện các hoạt động chuyên môn tại cơ sở điều trị theo đúng quy định hiện hành của Bộ Y tế;

- Hướng dẫn người bệnh tham gia điều trị các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và tự chăm sóc y tế tại nhà để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình theo các hướng dẫn của Bộ Y tế.

3. Hướng dẫn người bệnh đến uống thuốc tại các cơ sở điều trị:

- Thực hiện đeo khẩu trang khi đến uống thuốc hàng ngày;

- Bệnh nhân uống thuốc và thực hiện các quy định khác theo đúng hướng dẫn của nhân viên tại các cơ sở điều trị (khử khuẩn trước và sau khi uống thuốc; giữ khoảng cách với bệnh nhân khác khi đến uống thuốc);

- Không tụ tập và nói chuyện khi đến khám, tư vấn và uống thuốc tại cơ sở điều trị, đặc biệt tại khu vực cấp phát thuốc;

- Không tụ tập, nói chuyện trước và sau khi uống thuốc tại các khu vực xung quanh cơ sở điều trị.

4. Đối với công tác cung cấp dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện tại

các địa điểm có dịch và trong thời gian xảy ra dịch COVID-19:

- Tổ chức phân nhóm bệnh nhân đến uống thuốc tại các thời điểm khác nhau trong ngày, tránh tụ tập quá đông bệnh nhân;
- Sắp xếp lại lịch khám bệnh nhân với tần suất trên 2 tháng/lần;
- Giảm thăm khám, tư vấn, trao đổi trực tiếp; tăng cường trao đổi thông tin với bệnh nhân qua điện thoại và các phowng tiện liên lạc cá nhân khác;
- Không tổ chức tư vấn, sinh hoạt nhóm cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong thời gian có dịch COVID-19;
- Thực hiện việc cấp phát thuốc Methadone và Buprenorphine trong thời gian xảy ra dịch COVID-19 theo hướng dẫn chi tiết kèm theo.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ với Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế - Ngõ 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội - điện thoại: 0243. 736 7130 để phối hợp giải quyết.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh/thành phố/
Cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS các
tỉnh/thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, DP.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

Phạm Đức Mạnh

HƯỚNG DẪN CẤP PHÁT THUỐC METHADONE VÀ BUPRENORPHINE TRONG GIAI ĐOẠN DỊCH COVID-19

Mọi quy định về cấp phát thuốc Methadone/Buprenorphine ban hành kèm theo Hướng dẫn này chỉ thực hiện trong giai đoạn có dịch COVID-19. Sau khi dịch COVID-19 kết thúc, quy trình chuyển tiếp người bệnh, quy trình cấp phát thuốc thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

I. Hướng dẫn chuyển tiếp người bệnh khi cơ sở điều trị hoặc cơ sở cấp phát thuốc bị phong tỏa, cách ly

1. Sở Y tế chỉ đạo cơ sở điều trị, cơ sở cấp phát thuốc Methadone/Buprenorphine bị phong tỏa hoặc cách ly thực hiện việc chuyển tiếp người bệnh đang tham gia điều trị tại cơ sở mình đến cơ sở điều trị hoặc cơ sở cấp phát thuốc gần nhất, tạo điều kiện tối đa cho người bệnh tiếp tục tham gia điều trị.

2. Hạn chế việc chuyển tiếp điều trị cho người bệnh tham gia điều trị Methadone/Buprenorphine đến hoặc đi từ vùng có dịch COVID-19, trừ trường hợp quy định tại Điểm 1, Mục I, Hướng dẫn này.

II. Hướng dẫn cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh bị cách ly do dịch COVID-19

1. Nguyên tắc chung

- Người bệnh hoặc người nhà của người bệnh thông báo với cơ sở điều trị/cơ sở cấp phát thuốc ngay khi người bệnh phải thực hiện cách ly y tế liên quan đến dịch COVID-19.

- Cơ sở điều trị/cơ sở cấp phát thuốc có trách nhiệm xác minh tính chính xác thông tin do người bệnh hoặc người nhà của người bệnh cung cấp.

- Cơ sở điều trị/cơ sở cấp phát thuốc thực hiện quy trình cấp phát thuốc cho người bệnh bị cách ly y tế do dịch COVID-19 theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

- Không tiết lộ danh tính người bệnh cho những người không liên quan khi cho người bệnh uống thuốc Methadone trong thời gian cách ly.

2. Hướng dẫn cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh bị cách ly do dịch COVID-19

2.1. Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh bị cách ly tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở y tế

- Đối với người bệnh tham gia điều trị Methadone bị cách ly y tế do dịch COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, quy trình cấp phát thuốc cho người

bệnh thực hiện theo quy trình cấp phát thuốc cho người bệnh Methadone nằm điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 15 Thông tư số 14/2015/TT-BYT.

- Tùy thuộc điều kiện cụ thể và nhân lực của từng cơ sở điều trị/cơ sở cấp phát thuốc, số lượng người bị cách ly tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và khoảng cách từ cơ sở điều trị/cơ sở cấp phát thuốc đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cách ly, cơ sở điều trị/cơ sở cấp phát thuốc sẽ quyết định số liều lượng thuốc mang theo mỗi lần cấp phát cho người bệnh, đảm bảo tổng số thuốc mang đi không quá 07 ngày điều trị/1 người bệnh (Thông tư số 52/2017/TT-BYT).

2.2. Cấp phát thuốc cho người bệnh Methadone bị cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung

- Đối với người bệnh tham gia điều trị Methadone bị cách ly y tế do dịch COVID-19 tại các cơ sở cách ly tập trung, quy trình cấp phát thuốc cho người bệnh bị cách ly thực hiện theo quy trình cấp phát thuốc cho người bệnh không thể đến cơ sở điều trị uống thuốc hàng ngày theo quy định tại Khoản 4, Điều 15 Thông tư số 14/2015/TT-BYT.

- Người giao thuốc Methadone của cơ sở điều trị/cơ sở cấp phát thuốc phối hợp với nhân viên y tế của cơ sở cách ly tập trung giám sát việc uống thuốc của người bệnh và ký xác nhận vào Phiếu theo dõi điều trị cùng người bệnh.

- Tùy thuộc điều kiện cụ thể và nhân lực của từng cơ sở điều trị/cơ sở cấp phát thuốc Methadone, số lượng người bị cách ly tại cơ sở cách ly tập trung và khoảng cách từ cơ sở điều trị/cơ sở cấp phát thuốc đến địa điểm cách ly, cơ sở điều trị/cơ sở cấp phát thuốc Methadone sẽ quyết định số liều lượng thuốc mang theo mỗi lần cấp phát cho người bệnh, đảm bảo tổng số thuốc mang đi không quá 07 ngày điều trị cho mỗi người bệnh (Thông tư số 52/2017/TT-BYT).

- Vỏ lọ đựng thuốc Methadone sau khi sử dụng được đơn vị cách ly tập trung thu lại và bàn giao trả lại cơ sở điều trị/cơ sở cấp phát thuốc Methadone khi nhận đợt thuốc mới hoặc sau khi kết thúc thời gian cách ly của người bệnh.

2.3. Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh cách ly tại nhà

- Đối với người bệnh tham gia điều trị Methadone bị cách ly y tế tại nhà do dịch COVID-19: quy trình cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh thực hiện theo quy trình cấp phát thuốc cho người bệnh không thể đến cơ sở điều trị uống thuốc hàng ngày theo quy định tại Khoản 4, Điều 15 Thông tư số 14/2015/TT-BYT.

- Trường hợp địa phương có nhân viên y tế hỗ trợ theo dõi người bệnh được cách ly tại nhà: Người giao thuốc Methadone của cơ sở điều trị/cơ sở cấp phát thuốc phối hợp với nhân viên y tế này giám sát việc uống thuốc Methadone của người bệnh và ký xác nhận vào Phiếu theo dõi điều trị cùng người bệnh.

- Vô lọ đựng thuốc Methadone sau khi sử dụng thu lại và bàn giao trả lại cơ sở điều trị/cơ sở cấp phát thuốc Methadone khi nhận đợt thuốc mới.

2.4. Chuẩn bị thuốc Methadone cấp phát cho người bệnh bị cách ly

a) Kế đơn thuốc Methadone cho người bệnh bị cách ly: Bác sỹ điều trị Methadone thực hiện việc kê đơn thuốc cho người bệnh bị cách ly theo đúng quy định tại Điều 13, Thông tư số 14/2015/TT-BYT.

b) Chuẩn bị thuốc Methadone cấp phát cho người bệnh bị cách ly:

- Căn cứ vào đơn thuốc của bác sỹ điều trị, nhân viên cấp phát thuốc của cơ sở điều trị/cơ sở cấp phát thuốc Methadone chuẩn bị thuốc cho người bệnh theo từng ngày điều trị. Thuốc Methadone được đựng trong lọ kín và dán niêm phong (nếu cần).

- Nhân viên cấp phát thuốc chuẩn bị nhãn phụ để dán vào lọ đựng thuốc cho bệnh nhân theo quy định tại Điều 10, Thông tư số 01/2018/TT-BYT về quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

- Mẫu nhãn phụ tham khảo, có đóng dấu treo của cơ sở Methadone

**THUỐC METHADONE CẤP PHÁT
CHO NGƯỜI BỆNH CÁCH LY DO COVID-19
Tên cơ sở điều trị:**

Họ tên BN: **Liều dùng:** **Ngày uống:**/...../2020

3. Quy trình cấp phát thuốc cho người bệnh tham gia điều trị Buprenorphine bị cách ly do dịch COVID-19

3.1. Việc cấp phát thuốc cho người bệnh tham gia điều trị Buprenorphine bị cách ly y tế do dịch COVID-19 thực hiện như đối với người bệnh tham gia điều trị Methadone.

3.2. Tùy thuộc điều kiện cụ thể và nhân lực của từng cơ sở điều trị Buprenorphine, số lượng người bị cách ly và khoảng cách từ cơ sở điều trị đến địa điểm cách ly, cơ sở điều trị Buprenorphine sẽ quyết định số liều lượng thuốc mang theo mỗi lần cấp phát cho người bệnh, đảm bảo tổng số thuốc mang đi không quá 10 ngày điều trị/1 người bệnh (Thông tư số 52/2017/TT-BYT), trừ trường hợp người bệnh cách ly tại nhà.

3.3. Thuốc Buprenorphine là thuốc hướng tâm thần và dạng viên ngậm dưới lưỡi do đó không cần chuẩn bị lọ đựng thuốc như Methadone. Thu hồi vỏ vỉ thuốc Buprenorphine sau khi sử dụng để huỷ vỏ vỉ thuốc theo đúng quy định hiện hành.

Trong một số tình huống đặc biệt, Sở Y tế chủ động bố trí các phương tiện hoặc triển khai mô hình cấp phát thuốc phù hợp với điều kiện của địa phương nhưng cần đảm bảo thực hiện đúng các quy định hiện hành của Bộ Y tế về quản lý thuốc gây nghiện, hướng thần./.

*

* *